

LE SENTIER DU CHÊNE VERT ou Sentier de découverte des habitats de la Malepère

Réalisé par l'association
Lo Cap, la Lenga e las Cambas
11290 Roullens

Printemps 2018



Présentation du sentier

Nous avons proposé de créer un sentier pédagogique d'environ 2,5 km suite aux trois constats suivants :

- la notion de sentier pédagogique botanique en milieu naturel pose un réel problème de fond car, devant un panneau nommant une plante, le plus souvent sont présentes plusieurs plantes, associées en une communauté végétale ou *habitat*, de sorte que le non-spécialiste non guidé ne peut vraiment savoir quelle plante est nommée ou alors risque de rester sur une erreur,
- la commune de Roullens est intégrée au site Natura 2000 FR9101452 (*Massif de la Malepère*) surtout au titre de la présence de chauves-souris (Chiroptères) inscrites à l'annexe II de la directive européenne Habitats – Faune – Flore,
- des habitats de l'annexe I de cette même directive sont aussi présents sur la commune.

Il s'agit d'un parcours de randonnée balisé au moyen de traits rouges et jaune verdâtre, longeant une certaine diversité d'habitats naturels (chênaies vertes, garrigues calcaires, garrigues acidifiées, lisières herbacées vivaces ou annuelles, lisières arbustives) identifiés par des bornes numérotées fixées en terre et renvoyant à ce livret guide illustré d'une présentation de ces habitats et des principales plantes (listes non exhaustives) qui les caractérisent. Ce livret est imprimé sur papier (protégé par plastification et mis à la disposition des utilisateurs) et téléchargeable sur internet. Une lecture à deux niveaux y est proposée : d'un côté pour le grand public, d'un autre pour des spécialistes au moyen d'encarts verts en caractères plus petits donnant des informations plus scientifiques et des orientations bibliographiques sur ces habitats.

Les noms des plantes citées sont mis en français (pour le grand public), en latin (langage international de la botanique) et en occitan (langue régionale ; liste incomplète car toutes les plantes rencontrées ne présentent pas un tel nom ; graphie normalisée).

Les numéros qui suivent le nom français des plantes renvoient à des photographies rassemblées sur des planches.

Ce sentier pédagogique, prévu pour tout public (quelques aménagements ont été réalisés sur des pentes difficiles), devrait s'intégrer au sein d'un projet plus large de sentier de découverte du patrimoine de notre commune.

Conseils pour la randonnée découverte - Le printemps est la saison optimale de visite pour bénéficier du maximum de floraison. Prévoir un chapeau, de bonnes chaussures de marche (bottes inutiles), de l'eau en cas de temps chaud, éventuellement une loupe de naturaliste pour observer finement les plantes et une canne de randonnée. Ne pas hésiter à se déplacer de part et d'autre des plots pour découvrir les espèces végétales.

Remerciements

Ce projet réalisé par l'association *La Cap, la Lenga e las Cambas* a bénéficié de l'aide de Carcassonne-Agglo et de la commune de Roullens, ainsi que du partenariat avec *Lou Cami del Vi* ; nous tenons à remercier vivement ces structures et leurs représentants.

Nos remerciements s'adressent aussi à Christiane et Jacques Rives, à Jérôme Vacquié, à G. Chayla, propriétaires de parcelles riveraines du sentier, qui nous ont autorisés à traverser certaines d'entre elles.

Jean Sanègre nous a beaucoup aidés à parfaire les noms

occitans des plantes. Laure Lassartesses nous a aidés et conseillés pour quelques points techniques.

Relectrices : Chantal Le Bonhomme, Evelyne Lesceux, Christiane Rives et Vicky Thilvert ont assuré une soigneuse relecture finale de cette plaquette.

Nous avons une dette spéciale envers Nicolas Garrouste qui nous a prêté sa tarière à moteur thermique pour faciliter l'installation des plots.



Départ du point **A**, sous la RD 36 et sous le cimetière (N 43° 09' 48,3", E 2° 16' 13.7"), se diriger vers **B** (point d'arrivée du sentier menant à la vigne communale) et dépasser ce point pour atteindre le plot **1**.

Station 1 en bord droit de sentier

Présence d'une lisière herbacée vivace (« ourlet ») et d'une lisière arbustive.

La première est assez riche en espèces : Gaillet maritime (**1** : plante velue, à feuilles paraissant fixées par plus de 2 autour de la tige (en fait 2 feuilles et des stipules), fleurs minuscules ; plante n'existant en France que dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales), Iris fétide (**2** : feuilles en lame de sabre, fétides au froissement), Dactyle hispanique, Urosperme de Daléchamps (**3** : fleurs blanc jaunâtre, ressemblant à celle du Pissenlit), Violette blanche (**4** : plante sans tige, à feuilles en forme de cœur, petites fleurs vernaies), Garance vagabonde (**5** : plante accrochante, à « 4 feuilles verticillées », en fait 2 feuilles et 2 stipules, fleurs verdâtres), Tamier commun (**6** : plante souvent grimpante à feuilles en cœur), Euphorbe denticulée (**7** : plante à latex : couper un bout de feuille et observer le lait qui s'écoule, feuilles denticulées, fleurs jaunâtres), Rouvet (**8** : plante semi-parasite racinaire, de la famille du Santal), Silène d'Italie (**9** : feuilles opposées, fleurs blanches inclinées vers le sol).

La lisière arbustive se présente comme un fourré en arrière

de l'ourlet précédent, dominé par le Laurier tin (**10** : feuilles opposées, simples et entières, persistantes, fleurs blanches, fruits bleutés), Aubépine (**11** : épineux, feuilles simples, divisées, alternes, fleurs blanches), Églantier toujours vert (**12** : feuilles alternes, composées de folioles, persistantes), Chèvrefeuille étrusque (**13** : feuilles simples, entières, opposées), Cornouiller sanguin (**14** : feuilles simples et entières, opposées, fleurs blanches), Orme (**15** : feuilles simples, alternes, dissymétriques à la base), Lierre (**16** : feuilles lobées, persistantes), Spartier d'Espagne (**17** : feuilles simples, tombant rapidement, la photosynthèse étant alors réalisée par les tiges, fleurs jaunes), Troène (**18** : feuilles opposées, simples et entières, fleurs blanches), Bryone (**19** : plante grimpante à vrilles), Prunellier (**20** : épineux, feuilles alternes, simples, denticulées, fleurs blanches, fruits bleutés), Garance vagabonde (**5**), Chêne vert (**21** : feuilles alternes, persistantes, souvent munies de dents piquantes), Chêne pubescent (**22** : feuilles alternes, pubescentes, sans dents piquantes) ; plus rares sont le Néflier d'Allemagne (**23**) et le Fragon (**24**, voir **station 2**).

*L'ourlet vivace n'est pas encore décrit. Le fourré correspond au **Roso sempervirentis** – **Viburnetum tini**, alliance du **Pruno – Rubion ulmifolii** (de Foucault, 2015).*



1. Gaillet maritime



2. Iris fétide



3. Urosperme de Daléchamps



4. Violette blanche



5. Garance vagabonde



6. Tamier commun



7. Euphorbe denticulée



8. Rouvet



9. Silène d'Italie



10. Laurier tin



11. Aubépine



12. Églantier toujours vert



13. Chèvrefeuille étrasque



14. Cornouiller sanguin



15. Orme



16. Lierre




17. Spartier d'Espagne



18. Troène



19. Bryone



20. Prunellier



21. Chêne vert



22. Chêne pubescent



23. Néflier d'Allemagne



24. Fragon

Après le plot **1**, continuer le chemin pour atteindre le point **C**, laisser le chemin qui part à droite (privé) et celui qui monte tout droit pour se diriger vers la gauche à travers la chênaie verte et atteindre le plot **2**.

Station 2 en bord droit de sentier

Au-dessus du sentier, s'étend un boisement à sous-bois sombre, dominé par le Chêne vert, verticalement stratifié :

- strate supérieure : formée d'arbres, ici Chêne vert (21) et Chêne pubescent (22) ;
- strate moyenne : à arbrisseaux, dont Laurier tin (10), Arbousier (25 : feuilles alternes, persistantes, denticulées, fleurs automnales en grelot), Églantier toujours vert (12), jeunes Chêne vert (21) et Chêne pubescent (22) ;
- strate inférieure : herbacée, à Garance vagabonde (5), Lierre (16), petit Laurier (26 : feuilles simples et entières, persistantes, fleurs jaune verdâtre en fin d'hiver), Fragon (24 : « feuilles » piquantes, en fait des tiges aplaties photosynthétiques appelées *cladodes*), Euphorbe des bois (27 : plante à latex, fleurs jaunâtres), Hellébore fétide (28 : feuilles profondément divisées en segments dentés, fleurs vernaes penchées vers le sol), Tamier commun (6), Épervière, Laîche glauque (29 : feuilles glauques, fleurs disposées en épis mâles en haut et femelles en-dessous), Laîche de Haller (30 : feuilles bien vertes), ainsi que de jeunes Arbousier (25), Laurier tin (10), Chêne vert (21) et Chêne pubescent (22) qui assurent la régénération des

strates supérieures.

En bord de sentier, se développe un « ourlet interne », soumis à un ombrage plus prononcé que l'ourlet vivace évoqué en **station 1** et qui rappelle beaucoup la strate herbacée du boisement : Garance vagabonde (5), Lierre (16), Euphorbe des bois (27), Hellébore fétide (28), Calament commun (31 : feuilles entières opposées, fleurs en glomérules à l'aisselle des feuilles supérieures), Gaillet blanc, petit Laurier (26), Brachypode des bois (32 : graminée à feuilles molles retombantes vert jaunâtre), Orchis pourpre (33 : orchidée à fleurs pourpres), Herbe au goudron (34 : feuilles à 3 divisions ; froisser l'une d'elles pour apprécier son odeur caractéristique), Chèvrefeuille étrusque (13), Églantier toujours vert (12), Clématite vigne-blanche (35 : feuilles divisées opposées, fleurs à 4 sépales blancs), Chêne vert (21), Aubépine (11), Laurier tin (10), Spartier d'Espagne (17).

Cette chênaie verte du Quercion ilicis est un habitat d'intérêt communautaire (code 9340).

Continuer le sentier vers le point **D** et tourner à droite (vers **E**). On laisse sur la gauche une friche assez complexe, alors qu'on longe sur la droite, et plus loin aussi à gauche, un fourré à Spartier d'Espagne (17), Laurier tin (10), Chêne vert (21), Chêne pubescent (22). Plus loin, apparaît une garrigue d'environ 80 cm de hauteur à Ciste cotonneux (36) et Genêt scorpion (37). Au point **E**, tourner légèrement à droite (petit escalier) pour entrer à nouveau dans une chênaie verte.

La garrigue à Genêt scorpion correspond au Cisto albidii – Genistetum scorpii.



25. Arbousier



26. Petit Laurier



27. Euphorbe des bois



28. Hellébore fétide



29. Laîche glauque



30. Laîche de Haller



31. Calament commun



32. Brachypode des bois



33. Orchis pourpre



34. Herbe au goudron



35. Clématite vigne blanche



36. Ciste cotonneux



37. Genêt scorpion

Station 3 en bord droit de sentier

La chênaie verte ressemble beaucoup à celle de la station 2 mais est intéressante par l'apparition d'orchidées :

- la strate supérieure renferme les deux mêmes chênes, avec en plus un arbousier (25) en arbre ;
- la strate moyenne, à arbrisseaux, s'enrichit ici en Tamier commun (6) grimpant et en Fragon (24) ;
- la strate inférieure, herbacée, est ici bien caractérisée : Fragon (24), petit Laurier (26), Garance vagabonde (5), Lierre (16), Herbe au goudron (34), Laîche glauque (29), Brachypode des bois (32), Laîche de Haller (30), Céphalanthère à longues feuilles (38 : belle orchidée à fleurs blanches), Orchis pourpre (33), Tamier commun (6), Chêne

vert (21), Arbousier (25), Laurier tin (10), Hippocrépide (39).

Poursuivre la montée jusqu'à gagner le point **F** au niveau d'un chemin plus large et éclairé, emprunter sa partie gauche en direction de **G**. S'arrêter à la station 4.

Station 4 en bord droit de sentier

L'intérêt de cette station est de montrer une végétation liée à un sol plus acide, qui n'a pas d'équivalent ailleurs sur ce sentier, mais que nous pouvons retrouver çà et là en Malepère.

La première unité est une lande d'environ 70 cm de hauteur qui héberge la fausse Bruyère ou Callune (40 : arbrisseau à feuilles très petites et imbriquées), le Ciste à feuilles de sauge (41 : feuilles opposées, fleurs blanches) et de jeunes Bruyère en arbre (42), Bruyère à balais (43), Spartier d'Espagne (17), Arbousier (25), Laurier tin (10).

En pénétrant un peu à l'intérieur de la partie boisée, en arrière de la lande, nous pouvons observer une seconde unité, un

fourré à bruyères où certains petits arbrisseaux de la lande précédente deviennent plus élevés : Bruyère en arbre (42), Bruyère à balais (43), Arbousier (25), Laurier tin (10), plus à nouveau Chêne vert (21) et Chêne pubescent (22).

Pour distinguer aisément les deux bruyères, il suffit d'observer l'extrémité des jeunes rameaux : celle en arbre a de nombreux petits poils denses, celle à balais n'en a pas ; au printemps, la première à des fleurs blanches bien visibles (42) , la seconde des fleurs peu visibles et rougeâtres (43).

*Alors que la lande n'est pas encore décrite, le fourré à Bruyère en arbre a été dénommé **Cytiso scoparii – Ericetum arboreae** (de Foucault,, 2015).*



38. Céphalanthère à longues feuilles



39. Hippocrépide



40. Callune



41. Ciste à feuilles de sauge



42. Bruyère en arbre



43. Bruyère à balais



44. Corroyère

Poursuivre sur le même chemin en direction de **G**, laisser à droite un chemin fermé par une chaîne et plus loin, après une courte descente, le chemin de randonnée non barré partant à droite. Arriver à **G** et s'engager à gauche en direction du point **H** au sein d'une sombre chênaie verte où l'on peut ne pas pénétrer (on y retrouve la plupart des espèces des stations **2** et **3**).

On sort de la chênaie en **H** pour déboucher, après un virage à droite, sur une zone cultivée à droite, tout en longeant un fourré à Églantier toujours vert et Laurier tin présenté en station **1**. Au point **I**, **station 5**.

Station 5

Cette station offre l'occasion de présenter le fourré dense à Spartier d'Espagne déjà évoqué entre les points **D** et **E**. C'est un exemple de végétation pionnière qui a tendance à envahir les zones anciennement cultivées (surtout en vigne) ou pâturées et actuellement délaissées par les agriculteurs ; au Spartier d'Espagne (**17**) s'ajoute assez souvent la Corroyère (**44** : feuilles opposées, à 3 nervures principales) et quelques

arbustes ou jeunes arbres rencontrés dans les unités précédentes.

Le fourré pionnier à Spartier d'Espagne correspond au Coriario myrtifoliae – Spartietum junceae, alliance du Pruno – Rubion ulmifolii (de Foucault, 2017a).

Reprendre le sentier en **I** pour gagner **J**. Au passage, remarquer à droite la garrigue basse à Ciste cotonneux (**36**) et Genêt scorpion (**37** : arbrisseau très piquant à fleurs jaunes) ; à gauche, on longe une chênaie verte, un fourré à Laurier tin et à nouveau la garrigue basse à Ciste cotonneux et Genêt scorpion. Faire un arrêt au point **J**.

Station 6a

La station présente un nouvel habitat, une petite garrigue éclairée développée sur sol mince et séchant en été. De nouvelles espèces y apparaissent : Thym commun (**45** : une des « herbes de Provence »), Globulaire commune (**46** : fleurs bleues en petites têtes sphériques), Héliantheme des Apennins (**47** : feuilles opposées très étroites, fleurs blanches), Lotier dorycnie (**48**), Euphorbe denticulée (**7**), Odontite jaune (**49** : fleurs jaunes à voir surtout en début d'automne), Origan sauvage (**50**), Orchis pourpre (**33**), Panicaud champêtre (**51** : à feuilles piquantes), Argyrolobe (**52** : feuilles à 3 divisions argentées, fleurs jaunes), Herbe au goudron (**34**), Liseron cantabrique (**53** : fleurs roses), Ophrys élevé (**54** : orchidée à

floraison très précoce), Fumana à feuilles de bruyère (**55** : fleurs jaunes), Astragale de Montpellier (**56** : fleurs pourpres), Urosperme de Daléchamps (**3**), Aphyllanthe de Montpellier (**57** : fleurs bleues), Orpin de Nice (**58** : plante grasse), Laîche de Haller (**30**), Staehéline (**59** : fleurs violacées), petite Coronille (**60** : plante basse à feuilles composées, fleurs jaunes), des graminées (pour les connaisseurs : Fétuque d'Occitanie, Brome dressé, Koelérie, Avoine vivace) accompagnées de jeunes arbustes et arbres déjà connus. Elle est ici un peu envahie par le Ciste cotonneux (**36**) et le Genêt scorpion (**37**).

Reprendre le sentier en **J** en traversant à nouveau une chênaie verte ; en cours de cheminement, laisser un sentier qui part sur la gauche ; juste en face, à droite, se trouve la station **6b**.

Station 6b

On retrouve ici une garrigue basse ressemblant à celle de la station **6a**, avec en plus Germandrée pouillot (**61** : feuillage et fleurs blanchâtres), Orchis bouffon (**62** : une orchidée du printemps), Bugrane très petit (**63**), Potentille du printemps (**64** : feuilles à 5 parties, fleurs jaunes précoces), Seseli des

montagnes, Lavande à larges feuilles, Thésion divariqué (**65** : fleurs blanches, famille du Santal), Œillet de Godron.

*Cette garrigue des stations 6a et 6b a été récemment décrite sous le nom de **Koelerio macranthae** – **Thymetum vulgaris** et se rattache aux **Rosmarinetalia offinalis**. Elle entre souvent en superposition avec une pelouse thérophytique basiphile, le **Lino stricti** – **Vulpietum ciliatae**.*



45. Thym commun



46. Globulaire commune



47. Hélianthème des Apennins



48. Lotier dorycnie



49. Odontite jaune



50. Origan sauvage



51. Panicaut champêtre



52. Argyrolobe



53. Liseron cantabrique



54. *Ophrys élevé*



55. *Fumana à feuilles de bruyère*



56. *Astragale de Montpellier*



57. *Aphyllanthe de Montpellier*



58. *Orpin de Nice*



59. *Staehéline*



60. Petite Coronille



61. Germandrée pouillot



62. Orchis bouffon



63. Bugrane très petit



64. Potentille du printemps



65. Thésion divariqué

Reprendre le chemin et passer en **L**, laisser la grande parcelle de gauche et se diriger vers **M**, où l'on a une vue vers le nord-ouest sur le village de Roullens et vers le nord-est sur les jardins familiaux.

Station 7 (en haut du talus à gauche, en lisière de chênaie)

Un peu avant **M**, sur la gauche, au niveau du talus abrupt à végétation peu dense, s'étend un « ourlet vernal » (invisible au-delà de juin). Peu compétitif, il occupe les ouvertures de la végétation vivace, où la concurrence est plus faible, et est caractérisé par le Tabouret perfolié (**66** : feuilles alternes, glauques, fruits = silicules), le Géranium pourpre (**67** : feuilles pentagonales, petites fleurs roses), le Géranium à feuilles rondes (**68** : feuilles rondes, petites fleurs roses), le Peigne de Vénus (**69** : feuilles très divisées, fleurs blanches, fruits en

forme d'aiguille), la Véronique à feuilles de lierre, la Cardamine hirsute (**70** : feuilles alternes, divisées, fruits = siliques explosives), la Doucette (**71** : feuilles opposées, toutes petites fleurs rosées ; ancêtre sauvage de la Mâche cultivée), les Bromes stérile (**72** : graminée à panicule pendante) et de Madrid (à panicule seulement inclinée), plus la Shérardie (**73**), le Myosotis très ramifié (**74**), les Lamiers pourpre (**75**) et hybride (**76**), le Gratteron, le Céraiste aggloméré, le Torilis d'Afrique (feuilles très divisées, ombelles très petites).

*Cet ourlet vernal correspond au
Geranio purpurei –
Microthlaspietum perfoliati,
(de Foucault, 2017b).*

À partir de **M**, prendre le sentier à gauche pour se diriger plein ouest vers le point **B** (sentier un peu tortueux, bien suivre le balisage) et finir à la station **8**.

Station 8

Cette dernière station offre une vue sur la parcelle de vigne que la commune de Roullens a confiée en gestion à l'association *Lou Cami del Vi*. Celle-ci assure la taille et l'entretien de la vigne, ainsi que la vendange en lien avec les habitants du village et les enfants de l'école de Roullens dans un esprit qui se veut intergénérationnel et convivial. Outre la vigne (cépage Merlot), y ont aussi été introduits des rosiers (variétés

anciennes, en tête de rang de vigne, un rang sur deux), du safran, de jeunes chênes truffiers (*Tuber aestivum*). Une étude de la végétation naturelle a été menée en 2015 ; elle a révélé la présence de plus d'une centaine d'espèces sauvages. On y trouve aussi des nichoirs aménagés pour accueillir des oiseaux.

Ce sentier des habitats s'achève par le retour au point **A**.



66. Tabouret perfolié



67. Géranium pourpre



68. Géranium à feuilles rondes



69. Peigne de Vénus



70. Cardamine hirsute



71. Doucette



72. Brome stérile



73. Shérardie



74. Myosotis très ramifié



75. Lamier pourpre



76. Lamier hybride

Index des noms de plantes cités, leur numéro de photo, leur nom latin et leur nom occitan

Nom français	N° photo	Nom latin	Nom occitan (graphie normalisée)
Aphyllanthe de Montpellier	57	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	Bragalon, Giussa
Arbousier	25	<i>Arbutus unedo</i>	Arboç
Argyrolabe	52	<i>Argyrolobium zanonii</i>	
Astragale de Montpellier	56	<i>Astragalus monspessulanus</i>	
Aubépine	11	<i>Crataegus monogyna</i>	Albrespi, Albepin
Avoine vivace		<i>Helictochloa bromoides</i>	
Brachypode des bois	32	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	
Brome de Madrid		<i>Bromus madritensis</i>	
Brome dressé		<i>Bromus erectus</i>	
Brome stérile	72	<i>Bromus sterilis</i>	Trauca-sac
Bruyère à balais	43	<i>Erica scoparia</i>	Bruga blanca
Bruyère en arbre	42	<i>Erica arborea</i>	Bruga negra
Bryone	19	<i>Bryonia dioica</i>	Nap del diable
Bugrane très petit	63	<i>Ononis minutissima</i>	Agavon menelet
Calament commun	31	<i>Clinopodium vulgare</i>	Baseli salvatje, Menta de rastol
Callune ou fausse Bruyère	40	<i>Calluna vulgaris</i>	Bruga falsa
Cardamine hirsute	70	<i>Cardamine hirsuta</i>	Botarèle griule
Céphalanthère à longues feuilles	38	<i>Cephalanthera longifolia</i>	
Céraiste aggloméré		<i>Cerastium glomeratum</i>	
Chêne pubescent	22	<i>Quercus pubescens</i>	Blaca, Garric
Chêne vert	21	<i>Quercus ilex</i>	Aousi, Euse, Ausina
Chèvrefeuille étrusque	13	<i>Lonicera etrusca</i>	Selvamaire, Mal de serba
Ciste à feuilles de sauge	41	<i>Cistus salviifolius</i>	Majorada
Ciste cotonneux	36	<i>Cistus albidus</i>	Argenti ?
Clématite vigne-blanche	35	<i>Clematis vitalba</i>	Vidalba ?
Cornouiller sanguin	14	<i>Cornus sanguinea</i>	Sanqui
Corroyère	44	<i>Coriaria myrtifolia</i>	Ròdor, Redol
Dactyle hispanique		<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i>	Dactil
Doucette	71	<i>Valerianella locusta</i>	Doceta salvatja
Églantier toujours vert	12	<i>Rosa sempervirens</i>	Garrabièr
Épervière		<i>Hieracium</i>	Èrba del fetgé
Euphorbe denticulée	7	<i>Euphorbia serrata</i>	Ginoscla palat ?
Euphorbe des bois	27	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Ginoscla boscarenc ?
fausse Bruyère ou Callune	40	<i>Calluna vulgaris</i>	Bruga falsa
Fétuque d'Occitanie		<i>Festuca occitanica</i>	Escabilhàs occitanenc
Fragon	24	<i>Ruscus aculeatus</i>	Bresegon
Fumana à feuilles de bruyère	55	<i>Fumana ericifolia</i>	
Gaillet blanc		<i>Galium album</i>	Amarari blanc
Gaillet maritime	1	<i>Galium maritimum</i>	Amarari marenc
Garance vagabonde	5	<i>Rubia peregrina</i>	Rabola
Genêt scorpion	37	<i>Genista scorpius</i>	Agadèus
Géranium à feuilles rondes	68	<i>Geranium rotundifolium</i>	Bèc de grua
Géranium pourpre	67	<i>Geranium purpureum</i>	Bèc de grua porpra
Germadrée pouillot	61	<i>Teucrium polium</i>	
Globulaire commune	46	<i>Globularia bisnagarica</i>	
Gratteron		<i>Galium aparine</i>	
Hélianthème des Apennins	47	<i>Helianthemum apenninum</i>	
Hellébore fétide	28	<i>Helleborus foetidus</i>	
Herbe au goudron	34	<i>Bituminaria bituminosa</i>	
Hippocrépide	39	<i>Hippocrepis emerus</i>	
Iris fétide	2	<i>Iris foetidissima</i>	
Koelérie		<i>Koeleria macrantha</i>	
Laiche de Haller	30	<i>Carex halleriana</i>	Riassa blar ?
Laiche glauque	29	<i>Carex flacca</i>	Riassa de Haller
Lamier hybride	76	<i>Lamium hybridum</i>	Mauvitge ibrid
Lamier pourpre	75	<i>Lamium purpureum</i>	Mauvitge porpra
Laurier tin	10	<i>Viburnum tinus</i>	Laurièr florit
Lavande à larges feuilles		<i>Lavandula latifolia</i>	Espic
Lierre	16	<i>Hedera helix</i>	Èdra
Liseron cantabrique	53	<i>Convolvulus cantabrica</i>	Campaneta cantabrica
Lotier dorycnie	48	<i>Lotus dorycnium</i>	Caprosset
Myosotis très ramifié	74	<i>Myosotis ramosissima</i>	Lapaçon
Néflier d'Allemagne	23	<i>Mespilus germanica</i>	Nespièr, Mesplièr
Odontite jaune	49	<i>Odontites luteus</i>	
Ophrys élevé	54	<i>Ophrys exaltata</i>	Portabelha nautièr
Orchis bouffon	62	<i>Anacamptis morio</i>	Cantagal pefon
Orchis pourpre	33	<i>Orchis purpurea</i>	Cantagal porpra, Pentacosta
Origan sauvage	50	<i>Origanum vulgare</i>	Majorana
Orme	15	<i>Ulmus minor</i>	Omat, Orma
Orpin de Nice	58	<i>Sedum sedifforme</i>	Rasim de Niça
Panicaut champêtre	51	<i>Eryngium campestre</i>	Canipaut, Panicaot
Peigne de Vénus	69	<i>Scandix pecten-veneris</i>	Penche de Magalona
petit Laurier	26	<i>Daphne laureola</i>	Lauriòla
petite Coronille	60	<i>Coronilla minima</i>	Gènesta naneta
Potentille du printemps	64	<i>Potentilla verna</i>	Sorbeireta primenc
Prunellier	20	<i>Prunus spinosa</i>	Agranhonièr, Boisson negre
Rouvet	8	<i>Osyris alba</i>	
Seseli des montagnes		<i>Seseli montanum</i>	Seseli de montanha
Shérardie	73	<i>Sherardia arvensis</i>	
Silène d'Italie	9	<i>Silene italica</i>	
Spartier d'Espagne	17	<i>Spartium junceum</i>	Ginest, Ginèsta
Stœbéline	59	<i>Staehelina dubia</i>	
Tabouret perfolié	66	<i>Microthlaspi perfoliatum</i>	
Tamier commun	6	<i>Dioscorea communis</i>	Responchon
Thésion divariqué	65	<i>Thesium humifusum</i> subsp. <i>divaricatum</i>	
Thym commun	45	<i>Thymus vulgaris</i>	Frigola comuna
Torilis d'Afrique		<i>Torilis africana</i>	
Troène	18	<i>Ligustrum vulgare</i>	Sangui blanc
Urosperme de Daléchamps	3	<i>Urospermum dalechampii</i>	
Véronique à feuilles de lierre		<i>Veronica hederifolia</i>	Veronica a fuèlha d'èdra
Violette blanche	4	<i>Viola alba</i>	Memòis blanc

Bibliographie élémentaire

Foucault B. (de), 2015. Quelques associations arbustives nouvelles pour la Malepère (Aude centrale). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, NS, **46** : 244-260.

Foucault B. (de), 2017a. Un nouveau syntaxon arbustif pour la Malepère (Aude) : le *Coriario myrtifoliae* – *Spartietum juncei*. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, NS, **48** 360-365.

Foucault B. (de), 2017b. Quelques ourlets thérophytiques de l'Aude. *Botanique* **2** : 23-36.